

Pseudotumor do Urotélio: Uma manifestação rara de Tuberculose Geniturinária

Tiago Mendonça; Maria Raquel Marques; Raul Rodrigues; Mafalda Melo; Sérgio Pereira; António Romão; Carla Soares; David Martinho; Tito Leitão; Tomé Lopes

Centro Hospitalar Lisboa Norte
Correspondência: tiago.a.mendonca@gmail.com

Introdução

A Organização Mundial de Saúde estima que um terço da população mundial está infectado com *Mycobacterium tuberculosis*, registando-se um aumento global da incidência nas últimas décadas. Em Portugal, a tuberculose continua a ser um importante problema de saúde pública. A tuberculose geniturinária é, após a tuberculose ganglionar, a forma mais comum de doença extrapulmonar.

Objectivos

Os autores apresentam um caso clínico de pseudotumor do urotélio superior cuja marcha diagnóstica e terapêutica revelou tratar-se, na verdade, de uma apresentação rara de tuberculose renal.

Desenvolvimento

Doente do sexo masculino, 59 anos, com quadro de hematúria macroscópica, polaquiúria e dor lombar à direita. Realizou TC abdomino-pélvica que revelou neoplasia do bacinete direito, com adenopatias hilares e inter-aorto-cava e espessamento da porção distal do ureter homolateral. Foi submetido a nefroureterectomia direita com cistectomia perimeática. O exame histopatológico da peça operatória revelou doença crónica granulomatosa associada a pielonefrite crónica agudizada e abcedada, com BAAR negativos, e ausência de células neoplásicas. Após a cirurgia o doente desenvolveu quadro de epididimite aguda refractária à terapêutica convencional. Realizou investigação adicional, da qual se destaca: piúria estéril; urina com exame cultural positivo para *M. tuberculosis*; TC torácica com infiltrados peribronquiolares nos lobos superiores; lavado bronco-alveolar com exame cultural positivo para *M. tuberculosis*; prova de Mantoux positiva. Foi estabelecido o diagnóstico de tuberculose disseminada e o doente iniciou terapêutica antibacilar com boa resposta clínica.

Conclusões

Os autores destacam a apresentação atípica deste caso de tuberculose geniturinária sob a forma de pseudotumor do urotélio superior, sublinhando a necessidade de um elevado índice de suspeição para o diagnóstico desta patologia.