

Retenção Urinária como Sintoma de Apresentação de Seminoma em Testículo Ectópico

Marco Dores; Miguel Rodrigues; Miguel Cabrita; Pedro Gomes; Aníbal Coutinho; Gilberto Rosa; José Neves

Hospital de Faro E.P.E.

Correspondência: mdadsemperfi@hotmail.com

Comunicação

Retenção urinária como sintoma de apresentação de Seminoma em testículo ectópico

Os tumores do testículo são uma patologia relativamente rara, constituindo aproximadamente 1-1,5% de todos os casos de cancro no homem. A alteração na descida dos testículos até ao escroto, quer a criptorquidia quer a ectopia testicular, é um dos principais factores identificados que aumenta o risco de degeneração maligna testicular.

Os autores trazem o caso de um jovem de 32 anos, com antecedentes de ausência de testículos na bolsa escrotal, que recorre ao SU por quadro de retenção urinária, após quadro de LUTS obstrutivos, com 2 meses de evolução, de instalação progressiva.

A observação e avaliação imagiológica revelaram a existência de massa de natureza sólida na região recto-vesical com cerca de 9cm. Marcadores tumorais sem alterações.

Realizou-se então excisão cirúrgica da massa. O resultado anatomo-patológico revelou tratar-se de um seminoma em testículo ectópico.

O doente iniciou então quimioterapia (BEP).

Após o 4º ciclo de quimioterapia, sofreu uma aplasia medular, acabando por falecer por pneumonia.