

Urinoma Bilateral Espontâneo: Uma complicação rara da Hiperplasia Benigna da Próstata

Tiago Mendonça; Branco da Palma; Raul Rodrigues; Mafalda Melo;
António Romão; Sérgio Pereira; Carla Soares; David Martinho; Tito Leitão;
Tomé Lopes

Centro Hospitalar Lisboa Norte
Correspondência: tiago.a.mendonca@gmail.com

Introdução

Um urinoma, definido como uma colecção de urina que extravasou do sistema excretor, pode ser originado por traumatismo do aparelho urinário, iatrogenia cirúrgica ou, espontaneamente, por obstrução.

Objectivos

Os autores apresentam um caso clínico de urinoma bilateral espontâneo por obstrução infra-vesical, uma complicação rara da hiperplasia benigna da próstata.

Desenvolvimento

Doente do sexo masculino, 70 anos, com antecedentes de HBP refractária à terapêutica médica, que recorreu ao Serviço de Urgência por febre e dor no hipogastro e flanco direitos. Do exame objectivo destacavam-se Murphy renal positivo bilateralmente e presença de globo vesical. O estudo analítico revelou ligeira deterioração da função renal e elevação dos parâmetros de infecção/inflamação. Realizou TC abdominal e pélvica que revelou urinomas bilaterais, de maior dimensão à direita, sem ruptura visível da árvore pielo-calicial. Optou-se por abordagem conservadora com algaliação, antibioterapia e monitorização da reabsorção dos urinomas. O doente ficou assintomático após algaliação, com função renal normalizada às 48 horas. Manteve-se apirético. Urografia de eliminação 4 semanas depois revelou normal morfologia do sistema colector e normal excreção de contraste. Foi submetido a prostatectomia com resolução completa do quadro clínico.

Conclusões

O urinoma espontâneo por obstrução infra-vesical provocada por HBP é uma situação rara, havendo apenas dois casos publicados na literatura mundial, e nenhum com envolvimento bilateral. Tanto quanto é do nosso conhecimento, este é o primeiro caso bilateral descrito.