

# Neoplasia Perineal Histologicamente Inclassificável

Tito Leitão<sup>1</sup>; Pedro Barros<sup>1</sup>; Francisco Martins<sup>2</sup>; Tomé Lopes<sup>1</sup>

1 - Centro Hospitalar Lisboa Norte;

2 - Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano-Hospital de Portalegre

Correspondência: titoleitao@hotmail.com

## Introdução

Os tumores perineais são raros, com pico de incidência na 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> décadas de vida, afectando igualmente ambos os sexos. O tipo histológico mais frequente é o sarcoma. Apresentam-se geralmente como massa de grandes dimensões.

## Objectivos

Neste vídeo apresentamos uma pielocalicolitomia laparoscópica numa doente com litíase do bacinete e cálice inferior.

## Desenvolvimento

A abordagem do rim foi transperitoneal, com a colocação de 4 portas. Após exposição do ureter proximal e bacinete foi realizada uma pielotomia com litoextracção do bacinete com pinça. Para a extracção do cálculo do cálice inferior foi introduzido um cistoscópio flexível através de uma porta de 11mm, com o qual foi abordado o cálice inferior através da incisão de pielotomia e extraído o cálculo com uma pinça de corpos estranhos flexível. A cirurgia decorreu sem intercorrências, com extracção da totalidade dos cálculos.

## Conclusão

Este vídeo mostra ser possível e eficaz a utilização de um cistoscópio flexível através de uma porta de laparoscopia para a captura de cálculos caliceais pouco acessíveis numa pielolitomia convencional.