

Diagnóstico de Tumor Renal em doentes submetidos a Nefrectomia Radical

Vanessa Ferreira Vilas Boas¹; Jorge Morales²; Hugo Pardal²; Sofia Lopes²; Nelson Menezes²; Cabrita Carneiro²; Almeida Santos²; Galego P¹

1 - Centro Hospitalar de Lisboa Central;

2 - CHLC

Correspondência: vanessa_vilas_boas@hotmail.com

Introdução e Objectivos

O carcinoma de células renais, antigamente conhecido como o “tumor do internista”, dada a sua frequente manifestação inicial como síndrome paraneoplásico é cada vez mais o “tumor do imagiologista”. O uso rotineiro de exames de imagem como a ultrassonografia abdominal tem permitido o seu diagnóstico incidental, sendo a tríade clássica dor, hematúria e massa palpável cada vez mais rara.

Assim, o objectivo deste trabalho é analisar a apresentação inicial do tumor renal, assim como os métodos imagiológicos utilizados no seu diagnóstico em doentes submetidos a nefrectomia radical no Serviço de Urologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central

Materiais e Métodos

Os autores efectuaram uma revisão sistemática dos processos clínicos dos doentes submetidos a Nefrectomia Radical por tumor renal de Janeiro de 2005 a Janeiro de 2009.

Resultados

Apresentam-se os resultados do estudo retrospectivo efectuado, nomeadamente características dos doentes operados (idade, sexo), forma de apresentação inicial, estadiamento pré-operatório e comparação deste com o estadiamento patológico.

Conclusão

Uma percentagem muito significativa de doentes foi diagnosticada de forma incidental, em exames de rotina ou de avaliação de outras patologias, não se tendo verificado a tríade clássica em nenhum doente. A TC abdomino-pélvica parece ser um bom método de estadiamento pré-operatório, com elevada precisão.

Bibliografia

Russo P. Renal cell carcinoma: presentation, staging and surgical treatment. *Semin Oncol.* 2000 Apr; 27 (2): 160-76

Wein AJ, Kavoussi LR, Partin AW, Peters CA. *Campbell-Walsh Urology*, 9th Edition 2007

Ljungberg L. et al. *Guidelines on Renal Cell Carcinoma.* EAU 2009