

Prostatectomia Radical Laparoscópica

– Evolução dos tempos Cirúrgico e Pós-Operatório

Rui Lucio; Tania O. Silva; Ciprian Muresan; José João Marques;
Natália Martins; Rui Farinha; Luis Campos Pinheiro; Jorge Fonseca;
Rocha Mendes

Hosp. Curry Cabral
Correspondência: ruilucio@gmail.com

Introdução

A Prostatectomia Radical Laparoscópica (PRL) é uma alternativa mini-invasiva para o tratamento do carcinoma da próstata localizado, realizando-se num número cada vez maior de centros urológicos.

Objectivos

Pretende-se avaliar retrospectivamente a evolução dos tempos cirúrgico e de internamento pós-operatório nos doentes submetidos a PRL, no Serviço de Urologia do Hospital Curry Cabral.

Desenvolvimento

O tempo cirúrgico diminuiu progressivamente, sendo a sua média de 218 minutos. O tempo de internamento pós-operatório também tem diminuído de forma progressiva, sendo a sua média de 4 dias.

Conclusão

A diminuição do tempo operatório e pós-operatório de internamento pode estar relacionada com a maior experiência da equipa cirúrgica.

Bibliografia

1. Raboy A, Ferzli G, Albert P (1997) Initial experience with extraperitoneal endoscope radical retropubic prostatectomy. *Urology* 50:849-853
2. Guilloneau B, Vallancien G (2000) Laparoscopic radical prostatectomy: the Montsouris technique. *J Urol* 163:1643
3. Guilloneau B, Rozet F, Cathelineau X, Vallancien G et al (2002) Perioperative complications of laparoscopic radical prostatectomy: the Montsouris 3 year experience. *J Urol* 167:51-56