

Massa Vesical Gigante Invulgar como causa de Hematúria Episódica

Anatoliy S.¹; Hugo Capote²; Joaquina Dominguez³; Francisco Martins⁴;
Jaime Azevedo³

1 - Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano-Hospital de Portalegre;

2 - S/S;

3 - ULSNA;

4 - Centro Hospitalar Lisboa Norte

Correspondência: asandul@excite.com

Introdução e Objectivo

Acima dos 60 anos a causa mais frequente de hematúria é o tumor urotelial de bexiga. Relatamos um caso invulgar de hematúria macroscópica associada a massa intravesical gigante, simulando tumor vesical maligno.

Material e Métodos

Doente do sexo masculino, de 72 anos de idade, com ligeira sintomatologia miccional obstrutiva com 2 anos de evolução, refractária aos alfa-bloqueantes, que recorreu ao Serviço de Urgência por episódio isolado de hematúria macroscópica, monossintomática. Em exame objectivo, palpava-se uma massa no hipogastro, móvel e indolor. O toque rectal revelou aumento do volume prostático, compatível com hiperplasia benigna da próstata (HBP) grau IV. A avaliação imagiológica (ecografia vesical e TC pélvica) revelou volumosa massa intravesical, sólida, heterogénea, preenchendo a quase totalidade do lúmen vesical. A avaliação laboratorial era irrevelante, excepto um PSA total de 15,7 ng/ml. Não foi possível realizar uretrocistoscopia por incapacidade de se transpor o colo vesical. A exploração cirúrgica detectou volumosa massa de provável origem prostática. Procedeu-se à excisão transvesical da referida massa tumoral que decorreu sem complicações, nomeadamente necessidade transfusional.

Resultado

O resultado anatomo-patológico revelou hiperplasia benigna prostática, pesando 530gr, e com 17cm de maior eixo. Com um “follow-up” de 7 meses, o doente encontra-se bem, com boa dinâmica miccional e sem recorrência de sintomas, nomeadamente hematúria.

Conclusão

Apesar da causa mais frequente de hematúria macroscópica, em indivíduos com mais de 60 anos, ser o tumor urotelial da bexiga, é importante uma rigorosa avaliação pré-operatória e um elevado grau de suspeição de situações mais invulgares, no sentido de se programar uma estratégia terapêutica correcta. Salienta-se a relativa escassez de sintomas apesar do volume significativo da massa endovesical.