

Retenção Urinária Aguda

– Forma de apresentação de Hematocolpometra em jovem com Hímen Imperfurado

Frederico Branco¹; Branco, F.; Almeida, F.; Cavadas, V.; Gomes, M.J.; Osório, L.; Oliveira, M.; Oliveira, A.; Vila, F.; Teves, F.; Marcelo, F.²

1 - Hospital Geral de Santo António - Centro Hospitalar do Porto;

2 - Hospital Geral de Santo António- Porto

Correspondência: fredbl@hotmail.com

Introdução

O hímen imperfurado é uma das anomalias congénitas mais frequentes do aparelho genital feminino, ocorrendo em cerca de 0.1% dos recém-nascidos do sexo feminino. (1) Esta situação pode passar despercebida até á adolescência, sendo a apresentação clínica muito variada. A retenção urinária aguda é uma forma rara de apresentação (1).

Objectivos/ Caso clínico

Adolescente, 14 anos, pré-menarca, recorre ao SU do HGSA por quadro de dor abdominal hipogástrica de agravamento progressivo com 1 dia de evolução, acrescido de ausência de micção. Salienta episódios mensais de dores hipogástricas 2/3 dias por mês que cessam espontaneamente. Sem outras queixas. Sem febre ou alterações do trânsito intestinal. Sem antecedentes patológicos relevantes. No exame objectivo destaca-se massa hipogástrica volumosa dolorosa à palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal. Exame Ginecológico- hímen intacto não perfurado, com protusão de cor violácea. Realizou ecografia abdomino-pélvica que evidenciou globo vesical condicionado por efeito compressivo de colecção líquida retrovesical de aspecto heterogéneo de difícil caracterização que comunicava com a cavidade uterina; sem outras alterações. Após algaliação a doente foi submetida a intervenção cirúrgica, himeniotomia com saída de abundante drenagem hemática. O pós-operatório decorreu sem intercorrências obtendo a doente alta no dia seguinte.

Desenvolvimento

A apresentação clínica do hímen imperfurado é variável, sendo a principal queixa e motivo de consulta a amenorreia primária. A retenção urinária aguda como forma de apresentação do hematocolpos e hematométrio associados ao hímen imperfurado é um evento extremamente raro (3). A maioria destes casos é diagnosticada no início da adolescência.

Conclusão

O tratamento do hímen imperfurado consiste na incisão do hímen, com drenagem do conteúdo vaginal uterino e tubárico. Nos casos de hímen imperfurado complicado apenas com hematocolpos e hematométrio, o prognóstico é bom, apesar da retenção de considerável quantidade de líquido na vagina.

Bibliografia

- (1) Salvatf. Slamani L. Hematocolpos. Urinary retention in a female with hymen imperforated. J. Gynecol Obstet Biol Reprod 1998; 27:396-402.
- (2) Chandran L., Puccio JA. Outflow obstructions. <http://www.emedicine.com/> Last Updated: March 2008.
- (3) Chircop R. A case of retention of urine and haematocolpometra. Eur J Emerg Med 2003; 10:244-5