

# Linfadenopatias generalizadas como apresentação de Carcinoma da Próstata

Gameiro C<sup>1</sup>, Lopes<sup>1</sup> SP, Pardal H<sup>1</sup>, Vilas-Boas V<sup>1</sup>, Patena Forte JP<sup>1</sup>, Severo L<sup>1</sup>,  
Pereira H<sup>2</sup>, Cunha F<sup>2</sup>, Vaz Santos VH<sup>1</sup>

1 - Serviço de Urologia

2 - Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar de Lisboa, Zona Central

## Introdução

Apesar de a maioria dos doentes com Carcinoma da Próstata (CaP) se apresentar assintomática, a sintomatologia miccional continua a ser a mais frequente entre aqueles diagnosticados em estadios mais avançados. Linfadenopatias generalizadas são uma manifestação rara de CaP metastizado.

## Objectivos

A propósito do diagnóstico de CaP num doente apresentando-se inicialmente com hematuria e edema do membro inferior esquerdo como manifestação de doença disseminada com múltiplas adenopatias dispersas, faz-se uma revisão de alguns casos deste tipo descritos na literatura.

## Desenvolvimento

É descrito o caso de um doente de 68 anos de idade, que se apresenta no SU com quadro de hematuria total com repercussão hemodinâmica, edema do membro inferior esquerdo de aparecimento recente e massa inguinal esquerda volumosa. É feita ressecção de massa do colo vesical com o diagnóstico histológico de CaP. Clínica e imagiologicamente identificaram-se extensas e volumosas adenopatias em todas as cadeias abdominais e pélvicas, profundas e superficiais; a biopsia ganglionar inguinal superficial confirmou metástase de CaP. Foi iniciada terapêutica hormonal com boa resposta clínica e laboratorial.

## Conclusão

Estão descritos na literatura raros casos de apresentação de CaP com adenopatias generalizadas, sendo no entanto frequente a adenopatia cervical ou inguinais isoladas aquando do diagnóstico da doença. O diagnóstico diferencial com linfoma ou outra doença linfoproliferativa é mandatório. Embora se trate de uma manifestação rara de CaP, o quadro de linfadenopatia generalizada no contexto de qualquer outra manifestação de doença do baixo aparelho urinário deve implicar o estudo de doença prostática. A terapêutica pode passar por bloqueio hormonal, quimioterapia, radioterapia ou a combinação destas abordagens. Apesar do mau prognóstico, é de notar a melhoria na qualidade de vida oferecida pela intervenção terapêutica.

## Bibliografia

Huang E et al. Prostate adenocarcinoma presenting with inguinal lymphadenopathy. *Urology*. 2003, Feb. Vol 61 (2): 463.

Myung-Ju A et al. A case of prostate cancer in 34 year old man presenting with generalized lymphadenopathy mimicking malignant lymphoma. *JKMS*. 1997. Vol 12:262-5.

Ruiz S et al. Linfedema como presentación inusual de cáncer de próstata. *Actas Urológicas Españolas*. 2007. Marzo. Pp 289-291.