

Casuística de Adenocarcinoma da Próstata em 2007 e 2008

Nuno Domingues; Nuno Fidalgo; Carlos Santos; Macieira Pires; Rui Sousa

Hospital Militar Principal
Correspondência: nunomail@aeiou.pt

Introdução

Os autores pretendem determinar quais as opções terapêuticas realizadas pelo Serviço de Urologia nos doentes diagnosticados de novo com Adenocarcinoma da Próstata nos anos de 2007 e 2008.

Material e Métodos

Para esse efeito consultaram o processo clínico dos doentes diagnosticados de novo com Adenocarcinoma da Próstata em 2007 e 2008 e foram verificar qual a idade à data do diagnóstico, o score de Gleason e que tipo de tratamento realizaram.

Objectivos

Determinar o número total de novos doentes diagnosticados com Adenocarcinoma da Próstata nos anos de 2007 e 2008. Determinar a idade média à data do diagnóstico, o score de Gleason e o tipo de tratamento realizado.

Resultados

Nos anos de 2007 e 2008 foram diagnosticados 98 novos doentes com Adenocarcinoma da Próstata com uma idade média de 69,9 anos. No grupo de doentes com score de Gleason 6 a opção terapêutica mais realizada foi a Braquiterapia com 37%, seguida da Prostatectomia Radical com 22% e Vigilância com 19%. No grupo de doentes com score de Gleason 7 a opção terapêutica mais realizada foi a Hormonoterapia e a Radioterapia Externa com 32% seguida da Prostatectomia Radical com 23%.

Conclusão

No Serviço de Urologia do Hospital Militar Principal os doentes com Adenocarcinoma da Próstata de idade mais nova com score de Gleason baixo são normalmente propostos para Braquiterapia ou Prostatectomia Radical enquanto os doentes com idades mais velhas e com scores de Gleason mais altos são normalmente propostos para Radioterapia Externa ou Hormonoterapia.