

Nefroureterectomia por Retroperitoneoscopia

– Experiência do Hospital Curry Cabral

Jorge Fonseca; Natália Martins; Tania O. Silva; Rui Lucio; Ciprian Muresan;
José João Marques; Rui Farinha; Luis Campos Pinheiro; Rocha Mendes

Hosp. Curry Cabral

Correspondência: ajfonseca@live.com.pt

Introdução

A nefroureterectomia com cistectomia perimeática é uma opção terapêutica para o tratamento cirúrgico dos tumores do urotélio alto. A morbilidade associada a duas incisões abdominais ou a uma incisão abdominal extensa levou à introdução de técnicas endoscópicas para desinserção do meato ureteral e redução da morbilidade associada às incisões abdominais.

Objectivos

Descrever e avaliar a implementação da técnica.

Desenvolvimento

Os doentes submetidos a nefroureterectomia por retroperitoneoscopia foram avaliados em termos de idade, índice de massa corporal, tempo cirúrgico, volumes tumoral e da peça cirúrgica, perda de sangue, taxa de conversão para cirurgia aberta e do tempo de internamento pós-operatório.

Conclusão

A nefroureterectomia por retroperitoneoscopia com cistectomia perimeática contribui para a redução da morbilidade pós-operatória. É uma opção terapêutica disponível no Serviço de Urologia do Hospital Curry Cabral desde 2005, constituindo a opção preferencial dum número crescente de cirurgias.