

Nefrectomia Radical Aberta e Laparoscópica

- Experiência do Hospital Curry Cabral

Rui Lucio; Natália Martins; Tania O. Silva; Ciprian Muresan;
José João Marques; Rui Farinha; Luis Campos Pinheiro; Jorge Fonseca;
Rocha Mendes

Hosp. Curry Cabral
Correspondência: ruilucio@gmail.com

Introdução

A nefrectomia radical é a opção terapêutica mais frequente no tratamento cirúrgico dos tumores renais. Apresentamos a experiência do nosso Serviço com a técnica cirúrgica aberta e laparoscópica desde 2005 até Abril de 2009.

Objectivos

Comparar as duas técnicas, aberta e laparoscópica, em termos de selecção de doentes, parâmetros operatórios e pós-operatórios.

Desenvolvimento

Os dois grupos são equiparáveis em termos de idade e índice de massa corporal. O tempo cirúrgico nos doentes operados por via aberta foi menor, apesar dos volumes tumorais e das peças cirúrgicas serem maiores. A perda de sangue foi inferior na cirurgia laparoscópica e o tempo de internamento pós-operatório cerca de metade.

Conclusão

A nefrectomia radical laparoscópica é uma opção terapêutica disponível no Serviço de Urologia do Hospital Curry Cabral. Apesar do tempo operatório ser mais demorado, a cirurgia laparoscópica reduz significativamente o tempo de internamento pós-operatório e constitui a opção preferencial dum número crescente de cirurgias.

Bibliografia

Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA: Open and Laparoscopic Surgery of the kidney. Campbell-Walsh Urology, Ninth Edition 2007; 1686-1809.