

# Uretro-Perineostomia com Retalho Cutâneo de Blandy

**João Marcelino**

Centro Hospitalar Lisboa Norte  
Correspondência: jpaduamarcelino@gmail.com

## **Introdução**

Os apertos complexos da uretra anterior requerem, em muitos casos, de uma abordagem terapêutica em 2 tempos.

No 1º tempo, a uretro-perineostomia com um retalho cutâneo em U invertido (retalho de Blandy) oferece uma solução cirúrgica adequada para os apertos bulbares complexos muito proximais.

## **Objectivos**

Visualização dos passos fundamentais da técnica.

## **Material e Métodos**

Homem de 40 anos, raça negra, com um aperto cerrado e extenso (4 cm) da uretra bulbar proximal, fruto de um traumatismo externo e de múltipla instrumentação. Tem uma cistostomia.

A cirurgia foi efectuada por abordagem perineal com a criação de um retalho cutâneo em U invertido, com o objectivo de realizar uma anastomose livre de qualquer tensão entre o coto da uretra sã proximal, identificado por cistoscopia flexível anterógrada, e a pele.

## **Conclusão**

A uretro-perineostomia de Blandy é uma técnica cirúrgica simples e segura na resolução terapêutica, em 2 tempos, de um aperto complexo da uretra bulbar proximal.