

Neoplasia Vesical

– Patologia de Incidência Aumentada no Algarve?

Miguel Rodrigues¹; Marco Dores²; Pedro Gomes²; Miguel Cabrita²;
Gilberto Rosa²; Anibal Coutinho²; Jose Neves²

1 - Hospital Distrital de Faro;

2 - Hospital de Faro, E.P.E.

Correspondência: miguelfiliper@gmail.com

As neoplasias vesicais são uma patologia com elevada e crescente incidência no mundo ocidental, correspondendo à 4^a neoplasia mais frequente no homem e a 9^a mais frequente na mulher.

Perante o facto de cerca de ¼ das cirurgias urológicas do Hospital de Faro, E.P.E. terem como patologia de base a neoplasia vesical, os autores reviram as 498 cirurgias realizadas por neoplasia vesical entre 2004 e 2008.

Foram analisados os tipos de cirurgias efectuadas, distribuição etária, distribuição por género, sintomas de apresentação, factores de risco presentes, percentagem de doentes operados por recidiva, classificação histológica e anatomo-patológica, distribuição geográfica, terapêutica adjuvante e follow-up adoptado.

Os dados da análises quantitativa, apesar de não existir uma população padrão para comparação, parecem indicar uma incidência superior à média nacional, bem como um número elevado de doentes com tumor musculo-invasivo.

Bibliografia

1. Pinheiro et al., Cancer mortality in Portugal, Eur J Cancer, 2003 Nov, 39(17):2507-20
2. Pelucchi, C. et al, Mechanisms of disease: The epidemiology of bladder cancer; Nat Clin Pract Urol, 2006. 3(6): 327-40
3. Ries LAG, H., Krapch M et al., SEER Cancer Statistics Review, 1975-2003, Accessed 2006.