

# Cistectomia Radical Laparoscópica com Confecção de Neobexiga Ileal Ortotópica

Teixeira de Sousa<sup>1</sup>; Rui Oliveira<sup>1</sup>; Miguel Guimarães<sup>1</sup>; Alfredo Soares<sup>2</sup>; Mário Reis<sup>2</sup>; Francisco Cruz<sup>1</sup>

1 - Hospital de São João - Serviço de Urologia;

2 - Hospital da Ordem do Carmo - Serviço de Urologia

Correspondência: jmtsousa@gmail.com

## Introdução

A cistectomia radical é a técnica gold standard para o tratamento do carcinoma de células de transição (CCT), musculo-invasivo, clinicamente localizado. A abordagem laparoscópica surge como uma alternativa à cirurgia convencional, dado os resultados oncológicos sobreponíveis à custa de menor morbilidade, menor tempo de internamento e de recuperação pós-operatória, e melhor resultado estético.

## Objectivos

Apresentação, em formato de vídeo, do primeiro caso de tumor vesical tratado com cistectomia radical com derivação urinária ortotópica, utilizando a via laparoscópica, ilustrando os passos fundamentais desta abordagem cirúrgica.

## Desenvolvimento

Homem de 43 anos com o diagnóstico histológico de carcinoma de células de transição musculo-invasivo, clinicamente localizado. O doente foi submetido a cistectomia radical com linfadenectomia pélvica bilateral por via laparoscópica e confecção extra-corporal de neobexiga utilizando a incisão para extracção da peça cirúrgica (tamanho de 9 cm). A confecção da anastomose foi realizada por via laparoscópica, utilizando 6 pontos separados de Vycril 2/0. O tempo cirúrgico foi de 4.5 horas. A hemorragia per-operatória foi de 600cc, sem necessidade de transfusão de glóbulos rubros. Não houve complicações per ou peri-operatórias. O pós-operatório decorreu sem intercorrências, tendo o doente tido alta ao 8º dia pós-operatório, sem eventos relevantes a reportar. Com cerca de 1 ano decorrido, o doente apresenta-se continente durante o dia, apresentando episódios de incontinência nocturna esporádicos. Tem função sexual satisfatória com recurso a inibidores da PDE5.

## Conclusão

Esta é a primeira cistectomia radical laparoscópica com confecção de neobexiga reportada no nosso país. A cistectomia radical por via laparoscópica com confecção de neobexiga ileal ortotópica pela incisão utilizada para a extracção da peça cirúrgica é um procedimento exequível, com tempo cirúrgico comparável com a cirurgia clássica e sem complicações peri-operatórias no presente caso clínico. Esta abordagem apresenta as vantagens de uma cirurgia minimamente invasiva, com recuperação rápida para a vida activa e bons resultados em termos de continência e função sexual

## Bibliografia

Irwin BH. et al: Laparoscopic Radical Cystectomy: Current Status, Outcomes, and Patient Selection; Curr Treat Options Oncol. 2009 Apr 12. [Epub ahead of print]