

# Neo-Úraco Continente

## – Um Canal Cutâneo Continente Cateterizável

Raul Nunes Rodrigues, F. A. E. Martins, T. Mendonça, C. Soares, T. M. Lopes

Centro Hospitalar Lisboa Norte  
Correspondência: raulrodrigues31@gmail.com

### Introdução

A necessidade de auto-cateterização intermitente está bem estabelecida, particularmente em associação com disfunção neurogénica da bexiga. Alguns pacientes contudo, podem requerer um acesso continente alternativo à uretra nativa.

### Objectivos

Demonstramos, passo-a-passo, a construção de um neo-úraco continente. O conduto continente é formado por um retalho tubular cutâneo in-situ sobre uma algália 18F que se estende do umbigo até à cúpula da bexiga. Antes de anastomosar o retalho tubular à bexiga, este é passado entre fibras dos músculos rectos abdominais entrecruzadas para formar um mecanismo de continência por compressão extrínseca.

### Discussão

Apesar da nossa experiência ser limitada e os resultados a longo prazo ainda indisponíveis, esta parece ser uma alternativa promissora à auto-algaliação uretral em pacientes bem seleccionados, graças à sua simples construção cirúrgica, acesso abdominal e dispensa de uma reconstrução intra-abdominal com recurso a segmentos intestinais.

### Conclusão

A técnica apresentada constitui uma opção cirúrgica viável, simples com elevada aceitação por parte dos pacientes, em casos bem seleccionados.