

Nefroureterectomia extraperitoneal com cistectomia

Jorge Fonseca, Luís C. Pinheiro, Rui Farinha, **Tânia O. Silva**,
Ciprian Muresan, Jorge Rocha Mendes

Serviço de Urologia, Hospital de Curry Cabral

Introdução: A nefroureterectomia aberta, com duas incisões abdominais ou uma única incisão de lombotomia prolongada anteriormente para a região infra-umbilical, é um procedimento cirúrgico extenso que alguns cirurgiões substituíram pela desinserção endoscópica do ureter e uma única incisão abdominal de lombotomia. Com a introdução das técnicas laparoscópicas, é possível associar à nefroureterectomia laparoscópica a remoção da peça e a desinserção do ureter da bexiga por uma única incisão abdominal infra-umbilical.

Apresenta-se um cartaz de uma doente anteriormente submetida a nefroureterectomia laparoscópica, remoção da peça e desinserção do uréter da bexiga por uma incisão de Gibson.

Posteriormente, pelo tumor urotélio alto se ter revelado bilateral, a doente foi submetida a uma segunda nefroureterectomia extraperitoneal com cistectomia.

Material e Métodos: Doente com 53 anos e história de RTU-V em 2003 e 2004 por tumor superficial do urotélio grau II. Em 2006, é-lhe diagnosticado tumor do

bacinete esquerdo, sendo submetida a nefroureterectomia laparoscópica e cistectomia perimeática, com extração da peça por incisão de Gibson. Passado três meses, é-lhe diagnosticado segundo tumor do urotélio alto contralateral, pelo que, após tentativa frustrada de coagulação do tumor com laser por ureterorenoscopia, é submetida a nefroureterectomia laparoscópica direita com cistectomia extraperitoneal.

Resultados: A anatomia patológica revelou carcinoma papilar de alto grau sem envolvimento do parênquima renal ou tecido adiposo peripélvico. A bexiga não apresentava tumor. Presentemente, a doente encontra-se sob programa de hemodiálise e sem sinais de recidiva, clínicos ou imagiológicos.

Conclusão: A nefroureterectomia laparoscópica reduz a morbidade inerente a lombotomia, preserva o rigor oncológico da cirurgia, eventualmente comprometido nas técnicas que recorrem à desinserção endoscópica do uréter, associado a uma alta e um retorno à actividade profissional mais precoces.