

Quisto prostático obstrutivo

Campos, L.¹; Preto, M.²

¹ Interna do 1º ano do Internato Complementar de Urologia

² Assistente Hospitalar

Hospital do Divino Espírito Santo – Ponta Delgada

Director de Serviço: Dr. F. Rebimbas

Correspondência: Lilian Campos – E-mail: liliancncampos@gmail.com

Introdução: Apesar de pouco descritos na literatura, os quistos prostáticos são relativamente comuns, com uma incidência de 5% na população masculina. A maioria dos quistos prostáticos são assintomáticos e estão localizados na porção medial da próstata.

Material e métodos: Consulta do processo clínico do utente. Pesquisa na Medline/Pubmed com a palavra-chave “prostatic cyst”. Pesquisa bibliográfica em livros da especialidade.

Descrição do caso: Utente do sexo masculino, de 53 anos de idade com quadro clínico caracterizado predominantemente por sintomas urinários obstrutivos com

evolução de 2 meses e agravamento progressivo. IPSS (International prostate symptom score) de 18. Próstata pequena insuspeita ao toque. A ecografia prostática realizada identifica quisto volumoso (15 mm) da parede anterior da uretra prostática proximal. Medicado com bloqueantes sem melhoria. Submetido a RTU do quisto. No follow-up do doente verifica-se diminuição da sintomatologia com melhoria franca do IPSS (IPSS=02).

Conclusão: Este caso revela-se excepcional pela apresentação clínica e localização do quisto (com consequente riqueza das imagens colhidas). Verifica-se resolução clínica através da ressecção transuretral.