

# Prostatectomia Radical Laparoscópica. A experiência do Hospital Padre Américo, Vale de Sousa, EPE

Teixeira de Sousa J., Vendeira P, Castro H, Lindoro J

Serviço de Urologia do Hospital Padre Américo, Vale de Sousa, EPE.

**Introdução:** Estando na ordem do dia da discussão da comunidade urologia qual a melhor ou mais adequada via para a realização de prostatectomia radical (aberta, laparoscópica ou robótica), o nosso hospital tem vindo a realizar a prostatectomia radical por via laparoscópica extraperitoneal

**Material e Métodos:** Foram realizadas vinte e três cirurgias no período compreendido entre Novembro de 2005 a Março de 2007 (17 meses) em doente com adenocarcinoma da próstata Gleason 6 (9 doentes); 7 (12 doentes); 8 (2 doentes). com peso prostático compreendido entre 25 e 75 grama (peso médio de 43 g)

**Resultados:** Tempo operatório médio: 218 min. [149-290];

Linfadenectomia: 2

Necessidade de transfusão de concentrado de eritrócitos no período perioperatório: 1 U em dois doentes; 2 U em um doente.

Margens tumorais positivas: 2 doentes.(8,7%)

Tempo médio de internamento: 5,5 dias

Remoção da sonda vesical: 10º dia

Conversão para cirurgia aberta: 1

Continência: 80%

**Conclusão:** Embora com uma amostra relativamente reduzida verifica-se que se exceptuarmos o tempo cirúrgico os resultados são sobreponíveis ao descrito para a cirurgia aberto.

A laparoscopia, também na cirurgia prostática, é exequível e cada vez mais uma exigência do próprio doente.