

Carcinoma células renais com trombo tumoral intracava nível IV: Caso clínico

Pedro Antas de Barros, J. M. Alves, J. L. Carneiro de Moura

Serviço de Urologia do Hospital Santa Maria

Introdução: O carcinoma de células renais (CCR) apresenta apetência pela propagação venosa sob a forma de trombo tumoral.

A Veia Cava Inferior é afectada entre 4-10% dos casos, contudo apenas 1-3% têm trombo tumoral intracava com extensão à aurícula direita (nível IV).

Os autores apresentam um caso de um doente de sexo masculino, 67 anos de idade, com CCR direito com trombo tumoral intracava nível IV, diagnosticado na sequência de um quadro de embolia pulmonar, tratado cirurgicamente no nosso Hospital.

Material e Métodos: R.V.A., 67 anos de idade, hipertenso, aparentemente bem até Novembro de 2005, altura em que subitamente, sem factor desencadeante aparente, iniciou quadro de taquicardia, taquipneia, e dor torácica. Recorreu ao Hospital de Santarém, onde foi internado com o diagnóstico de embolia pulmonar. No decurso da investigação clínica, realizou TAC Abdominopélvico, tendo lhe sido diagnosticado um tumor renal polar inferior direito de 5 cm, com densificação da gordura perinéfrica adjacente, e trombo tumoral intracava com extensão intra-auricular direita.

O doente foi transferido para o nosso Hospital, tendo sido submetido a cirurgia multidisciplinar, que consistiu em nefrectomia radical direita com trombectomia por incisão auricular e cavotomia, com recurso a circulação extracorpórea.

Um mês após ter sido operado, o doente iniciou imunoterapia com interferão alfa, o que manteve por cerca de seis meses.

Resultados: O pós-operatório decorreu sem incidentes, tendo o doente tido alta hospitalar trinta dias após ter sido operado.

Actualmente, o paciente está clinicamente assintomático, apesar de apresentar metastização pulmonar e hepática.

Conclusão: O CCR com trombo tumoral intracava de nível IV, com infiltração da gordura perinéfrica, é uma patologia agressiva, com sobrevida aos 5 anos muito reduzida (0-25%).

O único tratamento com intuito curativo é a cirurgia radical, com imunoterapia complementar.