

Cirurgia da Incontinência Urinaria (IU) no Homem. Sling Uretral (Argus)

C. Jesus; D. Botelho; J. Vaz; N. Pires; F. Barroso; A. Soares

Hospital N^o S^o do Rosário - Barreiro

Introdução: A IU no homem é relativamente frequente desde o início da prostatectomia radical. Os tratamentos cirúrgicos utilizados são: esfíncter artificial, sling In-vanase, uso de substâncias periuretral (submucosa) e sling reajustável de silicone (Argus). O objectivo deste vídeo é demonstrar a técnica cirúrgica com mais um dispositivo disponível, para tratamento da IU no homem.

Material e Métodos: Entre Fev. e Abril de 2007, cinco doentes com o diagnóstico de IU pós prostatectomia radical foram operados. Os doentes tinham IU com mais de um ano de evolução. Apenas um doente não tinha sido sujeito a tratamento prévio da IU. Todos os doentes

foram submetidos à raquianestesia e a colocação de sling reajustável (Argus) por via perineal.

Resultados: O tempo médio de cirurgia foi de 30 minutos e dois dias de internamento em média. Um doente desenvolveu fistula no pós operatório diagnosticada após remoção do cistocáteter. O período pós operatório é curto. Em dois doentes foi necessário reajustar o dispositivo na sequência de retenção urinária. Não houve IU pós operatório em nenhum dos casos.

Conclusão: O Sling reajustável parece ser uma técnica efectiva no tratamento da IU no homem. A possibilidade de reajustar o dispositivo tanto na hipercorreção como hipocorreção torna esta técnica aliciante.